

# **Differentielle Affekt-Skala DAS**

Apl. Prof. Dr. Jörg Merten  
Prof. Dr. Rainer Krause

Fachrichtung 6.4 Psychologie  
Universität des Saarlandes  
Im Stadtwald  
6600 Saarbrücken

Die differentielle Affektskala DAS ist eine Übersetzung der Differential Emotion Scale von Izard (1982). Das Verfahren wurde in der Übersetzung aus dem Jahre 1985 von der Abteilung Klinische Psychologie der Universität des Saarlandes im Rahmen mehrerer Projekte (DFG Projekte Kr843-1, Kr843-2, Kr843-4), Dissertationen und Diplomarbeiten verwendet. Dabei stellte sich wie erwartet heraus, daß sich das Antwortverhalten in Abhängigkeit von der Situation unterscheidet, auf die das Verfahren angewendet wird.

Für die Situationen "politische Diskussion" (N=140) und Therapiestunde (N=150) wurde jeweils das affektive Selbsterleben sowie das wahrgenommene Erleben der Interaktionspartner erfragt.

Die DAS wurde außerdem im Rahmen eines therapiebegleitenden standardisierten Tagebuches im Längsschnitt zur Erhebung der Affektivität im Alltagsleben eingesetzt (N=1200).

Die Maße der zentralen Tendenz und Dispersion sind getrennt nach den beschriebenen Situationen weiter unten tabelliert. Die der Adjektivliste vorangestellten Instruktionen sind den jeweiligen Situationen angepaßt worden und werden den Tabellen vorangestellt.

## Zuordnung der Items des DAS zu Affektskalen

<b>Interesse</b>	aufmerksam konzentriert wach
<b>Freude</b>	vergnügt erfreut fröhlich
<b>Überraschung</b>	überrascht erstaunt verblüfft
<b>Trauer</b>	niedergeschlagen traurig entmutigt
<b>Wut</b>	wütend ärgerlich zornig
<b>Ekel</b>	angewidert angeekelt abgestoßen
<b>Verachtung</b>	verachtungsvoll spöttisch geringschätzend
<b>Angst</b>	erschreckt (eingeschränkt) <sup>1</sup> ängstlich furchtsam
<b>Scham</b>	gehemmt verschämt verlegen

---

<sup>1</sup>Das Item "eingeschränkt" wurde durch das Item "erschreckt" ersetzt. Die Werte in den Tabellen beziehen sich auf die Adjektivliste mit dem Item "eingeschränkt". In Zukunft sollte dieses Item jedoch nicht mehr verwendet werden, da es sich um eine schlechte Übersetzung handelte, die die faktorielle Validität negativ beeinflusst.

**Schuld**

3

reumütig

schuldig

tadelnswert

## Anwendung des DAS auf das affektive Erleben in dyadischen politischen Diskussionen

In den DFG Projekten Kr843-1,2 wurde das interaktive Verhalten von schizophrenen und psychosomatischen Versuchspersonen mit dem von gesunden verglichen. Dazu diskutierten je zwei Personen 20 Minuten lang über selbst gewählte politische Themen.

Am Ende der Diskussion wurde ihnen die DAS mit der angegebenen Instruktion vorgelegt.

### Instruktion

#### Selbstrating

Wie fühlten Sie sich während des eben stattgefundenen Gesprächs?

#### Fremdrating

Wie fühlte sich der Partner während des Gesprächs

### Reliabilitäten (interne Konsistenzen, Cronbachs Alpha) und Deskriptivwerte der DAS Skalen

#### Interne Konsistenzen

##### Selbstratings

DAS-Skala	
Interesse	.6876
Freude	.7673
Überraschung	.8086
Trauer	.6685
Ärger	.7761
Ekel	.6145
Verachtung	.6243
Angst	.6198
Scham	.5425
Schuld	.7199

#### DAS Skala: Ärger

Gruppe	N	zornig		wütend		ärgerlich		Ärger	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,16	0,56	1,18	0,51	1,36	0,79	3,71	1,58
Schizophrene	20	1,15	0,49	1,15	0,37	1,30	0,57	3,60	1,05
Interaktionspartner	20	1,20	0,89	1,25	0,72	1,40	0,99	3,85	2,48
- ambulante Sci.	10	1,000	0,00	1,00	0,00	1,10	0,32	3,10	0,32
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,30	0,67	3,30	0,67
- hospitalisierte Sci.	10	1,30	0,67	1,30	0,48	1,50	0,71	4,10	1,29
- Interaktionspartner	10	1,40	1,26	1,50	0,97	1,50	1,27	4,40	3,44
Psychosomatiker	30	1,23	0,57	1,37	0,72	1,37	0,81	3,97	1,81
Interaktionspartner	30	1,10	0,40	1,10	0,31	1,37	0,76	3,57	1,22
- Wirbelsäule	10	1,30	0,67	1,40	0,84	1,40	0,97	4,10	2,42
- Interaktionspartner	10	1,20	0,63	1,20	0,42	1,30	0,67	3,70	1,64
- Colitis	20	1,20	0,52	1,35	0,67	1,35	0,75	3,90	1,48
- Interaktionspartner	20	1,05	0,22	1,05	0,22	1,40	0,82	3,50	1,00
-- Colitis, männlich	10	1,30	0,67	1,40	0,70	1,30	0,67	4,00	1,63
-- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,20	0,42	3,20	0,42
-- Colitis, weiblich	10	1,10	0,32	1,30	0,67	1,40	0,84	3,80	1,40
-- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,10	0,32	1,60	1,07	3,80	1,32
Kontrollgruppe	40	1,15	0,48	1,08	0,35	1,38	0,81	3,60	1,32
KG, männlich	20	1,05	0,22	1,05	0,22	1,45	0,89	3,55	1,10
- KG, weiblich	20	1,25	0,64	1,10	0,45	1,30	0,73	3,65	1,53

**DAS Skala: Ekel**

Gruppe	N	angeekelt		abgestoßen		angewidert		Ekel	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,04	0,24	1,04	0,20	1,01	0,12	3,09	0,41
Schizophrene	20	1,15	0,37	1,20	0,41	1,05	0,22	3,40	0,88
Interaktionspartner	20	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
- ambulante Sci.	10	1,10	0,32	1,10	0,32	1,00	0,00	3,20	0,63
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
- hospitalisierte Sci.	10	1,20	0,42	1,30	0,48	1,10	0,32	3,60	1,07
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
Psychosomatiker	30	1,10	0,41	1,07	0,25	1,03	0,18	3,14	0,44
Interaktionspartner	30	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
- Wirbelsäule	10	1,20	0,63	1,10	0,32	1,00	0,00	3,30	0,67
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
- Colitis	20	1,05	0,23	1,05	0,22	1,05	0,22	3,05	0,23
- Interaktionspartner	20	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
--Colitis, männlich	10	1,11	0,33	1,10	0,32	1,10	0,32	3,11	0,33
-- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
-- Colitis, weiblich	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
--Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
Kontrollgruppe	40	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
- KG, männlich	20	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
- KG, weiblich	20	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00

**DAS Skala: Freude**

Gruppe	N	fröhlich		vergnügt		erfreut		Freude	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	2,58	0,94	2,49	1,00	2,82	0,95	7,88	2,39
Schizophrene	20	2,45	1,19	2,35	1,14	2,80	1,11	7,60	3,08
Interaktionspartner	20	2,60	0,75	2,30	0,80	2,95	0,94	7,85	1,73
- ambulante Sci.	10	2,30	1,25	2,30	1,16	2,80	1,23	7,40	3,20
- Interaktionspartner	10	3,00	0,47	2,70	0,82	2,90	1,10	8,60	1,65
- hospitalisierte Sci.	10	2,60	1,17	2,40	1,17	2,80	1,03	7,80	3,12
- Interaktionspartner	10	2,20	0,79	1,90	0,57	3,00	0,82	7,10	1,52
Psychosomatiker	30	2,53	0,97	2,52	0,95	2,59	0,95	7,62	2,48
-Interaktionspartner	30	2,70	0,88	2,57	0,94	2,80	0,81	8,07	2,05
- Wirbelsäule	10	2,50	0,71	2,60	0,97	2,60	0,70	7,70	1,89
- Interaktionspartner	10	2,60	0,52	2,30	0,67	3,00	0,94	7,90	1,66
- Colitis	20	2,55	1,10	2,47	0,96	2,58	1,07	7,58	2,80
- Interaktionspartner	20	2,75	1,02	2,70	1,03	2,70	0,73	8,15	2,25
--Colitis, männlich	10	2,60	0,97	2,67	0,87	2,67	1,12	7,89	2,76
-- Interaktionspartner	10	2,80	0,79	2,70	0,95	2,90	0,74	8,40	2,12
-- Colitis, weiblich	10	2,50	1,27	2,30	1,06	2,50	1,08	7,30	2,95
--Interaktionspartner	10	2,70	1,25	2,70	1,16	2,50	0,71	7,90	2,47
Kontrollgruppe	40	2,58	0,93	2,58	1,13	2,95	0,99	8,10	2,54
- KG, männlich	20	2,50	0,89	2,45	1,05	3,10	0,97	8,05	2,28
- KG, weiblich	20	2,65	0,99	2,70	1,22	2,80	1,01	8,15	2,83

**DAS Skala: Angst**

Gruppe	N	ängstlich		furchtsam		eingeschränkt		Angst	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,61	0,82	1,33	0,62	2,02	1,09	4,97	1,96
Schizophrene	20	2,25	0,85	1,85	0,88	2,40	0,99	6,50	2,04
Interaktionspartner	20	1,45	0,69	1,25	0,44	1,80	1,06	4,50	1,79
- ambulante Sci.	10	2,00	0,82	1,80	0,63	2,50	1,08	6,30	2,06
- Interaktionspartner	10	1,20	0,42	1,20	0,42	1,50	0,97	3,90	1,29
- hospitalisierte Sci.	10	2,50	0,85	1,90	1,10	2,30	0,95	6,70	2,11
- Interaktionspartner	10	1,70	0,82	1,30	0,48	2,10	1,10	5,10	2,08
Psychosomatiker	30	1,67	0,76	0,30	0,53	2,17	1,09	5,13	1,80
Interaktionspartner	30	1,47	0,73	1,20	0,41	2,13	1,22	4,80	1,71
- Wirbelsäule	10	1,90	0,74	1,20	0,42	2,30	1,06	5,40	1,26
- Interaktionspartner	10	1,60	0,84	1,30	0,48	1,70	0,48	4,60	1,51
- Colitis	20	1,55	0,76	1,35	0,59	2,10	1,12	5,00	2,03
- Interaktionspartner	20	1,40	0,68	1,15	0,37	2,35	1,42	4,21	2,04
--Colitis, männlich	10	1,60	0,52	1,30	0,48	2,60	0,97	5,50	1,43
-- Interaktionspartner	10	1,30	0,67	1,10	0,32	1,80	1,32	4,20	1,75
-- Colitis, weiblich	10	1,50	0,97	1,40	0,70	1,60	1,07	4,50	2,46
--Interaktionspartner	10	1,50	0,71	1,20	0,42	2,90	1,37	5,60	1,71
Kontrollgruppe	40	1,45	0,85	1,23	0,62	1,74	1,02	4,44	1,98
- KG, männlich	20	1,55	1,00	1,25	0,72	1,63	1,01	4,47	2,29
- KG, weiblich	20	1,35	0,67	1,20	0,52	1,85	1,04	4,40	1,70

**DAS Skala: Interesse**

Gruppe	N	wach		aufmerksam		konzentriert		Interesse	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	3,82	0,88	3,94	0,75	3,89	0,78	11,65	1,90
Schizophrene	20	3,70	0,80	3,65	0,67	3,60	0,68	10,95	1,36
Interaktionspartner	20	3,80	0,83	4,05	0,69	3,75	0,72	11,60	1,47
- ambulante Sci.	10	3,60	1,07	3,50	0,71	3,60	0,70	10,70	1,57
- Interaktionspartner	10	3,90	0,57	3,80	0,57	3,50	0,53	11,20	1,14
- hospitalisierte Sci.	10	3,80	0,42	3,80	0,63	3,60	0,70	11,20	1,14
- Interaktionspartner	10	3,70	1,06	4,30	0,82	4,00	0,82	12,00	1,70
Psychosomatiker	30	3,53	1,11	3,87	0,82	3,73	0,74	11,13	2,24
Interaktionspartner	30	4,00	0,83	4,07	0,69	4,10	0,96	12,17	2,13
- Wirbelsäule	10	3,60	1,17	3,50	0,97	3,50	0,71	10,60	2,50
- Interaktionspartner	10	3,90	0,88	3,80	0,63	3,80	0,92	11,50	2,17
- Colitis	20	3,50	1,10	4,05	0,69	3,85	0,75	11,40	2,11
- Interaktionspartner	20	4,05	0,83	4,20	0,70	4,25	0,97	12,50	2,09
--Colitis, männlich	10	3,80	1,14	4,00	0,82	3,70	0,95	11,50	2,64
-- Interaktionspartner	10	4,20	0,92	4,30	0,67	4,30	1,06	12,80	1,99
-- Colitis, weiblich	10	3,20	1,03	4,10	0,57	4,00	0,47	11,30	1,57
--Interaktionspartner	10	3,90	0,74	4,10	0,74	4,20	0,92	12,20	2,25
Kontrollgruppe	40	3,97	0,73	4,00	0,78	4,05	0,68	12,03	1,73
- KG, männlich	20	4,05	0,76	4,15	0,75	4,20	0,70	12,40	1,76
- KG, weiblich	20	3,90	0,72	3,85	0,81	3,90	0,64	11,65	1,66

**DAS Skala: Scham**

Gruppe	N	verschämt		verlegen		blöd		Scham	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,24	0,53	1,86	0,84	1,31	0,73	4,41	1,55
Schizophrene	20	1,45	0,76	2,00	1,03	1,50	0,76	4,95	1,93
Interaktionspartner	20	1,10	0,31	1,80	0,83	1,40	0,99	4,30	1,30
- ambulante Sci.	10	1,30	0,48	2,00	0,82	1,40	0,84	4,70	1,42
- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,60	0,70	1,50	1,27	4,20	1,23
- hospitalisierte Sci.	10	1,60	0,97	2,00	1,25	1,60	0,70	5,20	2,39
- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	2,00	0,94	1,30	0,67	4,40	1,43
Psychosomatiker	30	1,37	0,61	1,87	0,68	1,27	0,52	4,50	1,20
Interaktionspartner	30	1,30	0,60	1,67	0,80	1,23	0,63	4,20	1,75
- Wirbelsäule	10	1,50	0,53	1,90	0,57	1,20	0,63	4,60	1,17
- Interaktionspartner	10	1,30	0,48	1,60	0,97	1,20	0,63	4,10	1,85
- Colitis	20	1,30	0,66	1,85	0,75	1,30	0,47	4,45	1,23
- Interaktionspartner	20	1,30	0,66	1,70	0,73	1,25	0,84	4,25	1,74
--Colitis, männlich	10	1,20	0,42	1,70	0,48	1,30	0,48	4,20	0,92
-- Interaktionspartner	10	1,30	0,67	1,40	0,52	1,10	0,32	3,80	1,23
-- Colitis, weiblich	10	1,40	0,84	2,00	0,94	1,30	0,48	4,70	1,49
--Interaktionspartner	10	1,30	0,67	2,00	0,82	1,40	0,84	4,70	2,11
Kontrollgruppe	40	1,08	0,27	1,95	0,88	1,28	0,78	4,30	1,52
- KG, männlich	20	1,05	0,22	1,90	0,91	1,05	0,22	4,00	1,17
- KG, weiblich	20	1,10	0,31	2,00	0,86	1,50	1,05	4,60	1,79

**DAS Skala: Schuld**

Gruppe	N	schuldig		tadelnswert		reumütig		Schuld	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,17	0,51	1,38	0,76	1,14	0,47	3,68	1,29
Schizophrene	20	1,20	0,52	1,70	0,86	1,30	0,57	4,20	1,36
Interaktionspartner	20	1,15	0,67	1,35	0,67	1,00	0,00	3,50	1,19
- ambulante	10	1,20	0,63	1,50	0,53	1,30	0,67	4,00	1,05
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,30	0,48	1,00	0,00	3,30	0,48
- hospitalisierte	10	1,20	0,42	1,90	1,10	1,30	0,48	4,40	1,65
- Interaktionspartner	10	1,30	0,95	1,40	0,84	1,00	0,00	3,70	1,64
Psychosomatischer	30	1,24	0,51	1,38	0,68	1,34	0,77	3,97	1,48
Interaktionspartner	30	1,10	0,40	1,37	0,89	1,07	0,37	3,53	1,33
- Wirbelsäule	10	1,20	0,42	1,60	0,84	1,40	0,97	4,20	1,48
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,70	1,34	1,00	0,00	3,70	1,34
- Colitis	20	1,26	0,56	1,26	0,56	1,32	0,67	3,84	1,50
- Interaktionspartner	20	1,15	0,49	1,20	0,52	1,10	0,45	3,45	1,36
--Colitis, männlich	10	1,00	0,00	1,22	0,44	1,22	0,44	3,44	0,73
-- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,20	0,42	1,00	0,00	3,20	0,42
-- Colitis, weiblich	10	1,50	0,71	1,30	0,67	1,40	0,84	4,20	1,93
--Interaktionspartner	10	1,30	0,67	1,20	0,63	1,20	0,63	3,70	1,89
Kontrollgruppe	40	1,15	0,48	1,25	0,67	1,03	0,16	3,43	1,03
- KG, männlich	20	1,05	0,22	1,30	0,73	1,00	0,00	3,35	0,81
- KG, weiblich	20	1,25	0,64	1,20	0,62	1,05	0,72	3,50	1,24

**DAS Skala: Trauer**

Gruppe	N	entmutigt		niedergeschlagen		traurig		Trauer	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,41	0,80	1,26	0,61	1,27	0,67	3,93	1,61
Schizophrene	20	1,60	1,05	1,50	0,69	1,60	0,88	4,70	2,27
Interaktionspartner	20	1,60	0,99	1,20	0,52	1,35	0,75	4,15	1,50
- ambulante Sci.	10	1,50	0,71	1,50	0,71	1,40	0,70	8,10	3,03
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,40	0,97	7,80	3,08
- hospitalisierte Sci.	10	1,70	1,34	1,50	0,71	1,80	1,03	8,10	2,69
- Interaktionspartner	10	2,20	1,14	1,40	0,70	1,30	0,48	8,00	2,62
Psychosomatiker	30	1,60	0,81	1,43	0,73	1,28	0,84	4,24	1,94
Interaktionspartner	30	1,28	0,59	1,23	0,68	1,07	0,25	3,59	1,05
- Wirbelsäule	10	1,70	0,82	1,40	0,70	1,20	0,63	4,30	1,83
- Interaktionspartner	10	1,40	0,70	1,00	0,00	1,20	0,42	3,60	1,07
- Colitis	20	1,55	0,83	1,45	0,76	1,32	0,95	4,21	2,04
- Interaktionspartner	20	1,21	0,54	1,35	0,81	1,00	0,00	3,58	1,07
--Colitis, männlich	10	1,40	0,84	1,20	0,42	1,11	0,33	3,44	1,01
-- Interaktionspartner	10	1,11	0,33	1,50	0,97	1,00	0,00	3,67	1,12
-- Colitis, weiblich	10	1,70	0,82	1,70	0,95	1,50	1,27	3,80	1,40
--Interaktionspartner	10	1,30	0,67	1,20	0,63	1,00	0,00	3,80	1,32
Kontrollgruppe	40	1,18	0,59	1,08	0,35	1,20	0,52	3,45	1,13
- KG, männlich	20	1,15	0,67	1,00	0,00	1,10	0,31	3,25	0,72
- KG, weiblich	20	1,20	0,52	1,15	0,49	1,30	0,66	3,65	1,45

**DAS Skala: Überraschung**

Gruppe	N	verblüfft		überrascht		erstaunt		Überraschung	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,96	1,06	2,43	1,18	2,32	1,14	6,71	2,87
Schizophrene	20	2,50	1,15	2,75	1,12	2,85	1,14	8,10	2,79
Interaktionspartner	20	2,05	1,19	3,15	1,04	2,70	1,17	7,90	2,79
- ambulante Sci.	10	2,40	1,35	2,90	1,10	2,80	1,14	8,10	3,03
- Interaktionspartner	10	1,90	0,99	3,10	1,20	2,80	1,48	7,80	3,08
- hospitalisierte Sci.	10	2,60	0,97	2,60	1,17	2,90	1,20	8,10	2,69
- Interaktionspartner	10	2,20	1,40	3,20	0,92	2,60	0,84	8,00	2,62
Psychosomatiker	30	2,03	1,12	2,60	1,25	2,43	1,07	7,03	2,87
Interaktionspartner	30	1,87	0,97	2,17	1,15	2,27	1,20	6,30	2,91
- Wirbelsäule	10	2,30	1,06	2,90	1,37	2,60	1,17	7,80	2,97
- Interaktionspartner	10	1,90	0,88	1,90	0,99	2,40	1,26	6,20	2,78
- Colitis	20	1,89	1,15	2,45	1,19	2,35	1,04	6,63	2,81
- Interaktionspartner	20	1,85	1,04	2,30	1,22	2,20	1,20	6,35	3,05
--Colitis, männlich	10	1,33	0,5	2,40	1,07	2,20	0,79	5,78	1,92
-- Interaktionspartner	10	1,90	0,74	2,20	1,14	2,30	1,42	6,40	2,72
-- Colitis, weiblich	10	2,40	1,35	2,50	1,35	2,50	1,27	7,40	3,34
--Interaktionspartner	10	1,80	1,32	2,40	1,35	2,10	0,99	6,30	3,50
Kontrollgruppe	40	1,68	0,879	1,98	1,03	1,82	0,96	5,48	2,41
- KG, männlich	20	1,80	0,89	2,00	1,03	2,05	0,94	5,85	2,46
- KG, weiblich	20	1,55	0,89	1,95	1,05	1,60	0,94	5,10	2,36

**DAS Skala: Verachtung**

Gruppe	N	spöttisch		gerinschätzend		verachtungsvoll		Verachtung	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,19	0,46	1,22	0,54	1,06	0,27	3,47	1,00
Schizophrene	20	1,25	0,44	1,45	0,69	1,15	0,37	3,85	1,23
Interaktionspartner	20	1,15	0,37	1,10	0,31	1,05	0,22	3,30	0,47
- ambulante Sci.	10	1,10	0,32	1,30	0,48	1,00	0,00	3,40	0,52
- Interaktionspartner	10	1,20	0,42	1,00	0,00	1,10	0,32	3,30	0,48
- hospitalisierte Sci.	10	1,40	0,52	1,60	0,84	1,30	0,48	4,30	1,57
- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,20	0,42	1,00	0,00	3,30	0,48
Psychosomatiker	30	1,24	0,58	1,38	0,68	1,14	0,44	3,76	1,46
Interaktionspartner	30	1,13	0,43	1,27	0,64	1,00	0,00	3,40	0,93
- Wirbelsäule	10	1,30	0,67	1,70	0,82	1,20	0,42	4,20	1,69
- Interaktionspartner	10	1,20	0,63	1,50	0,85	1,00	0,00	3,70	1,34
- Colitis	20	1,21	0,54	1,21	0,54	1,11	0,46	3,53	1,31
- Interaktionspartner	20	1,10	0,31	1,15	0,49	1,00	0,00	3,25	0,64
--Colitis, männlich	10	1,44	0,73	1,44	0,73	1,22	0,67	4,11	1,76
-- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,10	0,32	1,00	0,00	3,20	0,63
-- Colitis, weiblich	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
--Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,20	0,63	1,00	0,00	3,30	0,67
Kontrollgruppe	40	1,20	0,46	1,00	0,00	1,02	0,16	3,23	0,53
- KG, männlich	20	1,25	0,55	1,00	0,00	1,05	0,22	3,30	0,66
- KG, weiblich	20	1,15	0,37	1,00	0,00	1,00	0,00	3,15	0,37

## Anwendung auf das affektive Erleben in Therapiestunden

### Instruktion

#### **Instruktion "Selbstrating" Therapeut und Patient:**

Wie haben Sie sich in der heutigen Stunde gefühlt?

#### **Instruktion "Fremdrating" Patientin / Patient:**

Wie glauben Sie hat sich die Therapeutin / der Therapeut in der heutigen Stunde gefühlt?

#### **Instruktion "Fremdrating" Therapeut:**

Wie glauben Sie hat sich die Patientin / der Patient in der heutigen Stunde gefühlt?

### Zusammensetzung der Therapien nach Geschlecht

	Therapeut	Patient
männlich	7	2
weiblich	3	8

### Interne Konsistenzen

#### **Selbstrating**

DAS-Skala	Therapeut Selbstrating	Patient Selbstrating	insgesamt Selbstrating
Interesse	.8712	.8398	.8637
Freude	.8087	.9341	.8943
Überraschung	.7738	.8926	.8583
Trauer	.8041	.8139	.8221
Ärger	.7999	.9352	.9055
Ekel	.7767	.8939	.8517
Verachtung	.7216	.6302	.6475
Angst	.6707	.8040	.7594
Scham	.6902	.8872	.8539
Schuld	.6777	.8874	.8345
alle Variablen	.8147	.8992	.8822

#### **Fremdrating**

DAS-Skala	Therapeut Fremdrating	Patient Fremdrating	insgesamt Fremdrating
Interesse	.8577	.7618	.8363
Freude	.8921	.9142	.9033
Überraschung	.8373	.7645	.8242
Trauer	.8042	.7866	.8695
Ärger	.8490	.8975	.9035
Ekel	.7719	.8674	.8549
Verachtung	.6009	.7204	.7336
Angst	.6958	.7755	.8641
Scham	.7775	.8005	.8928
Schuld	.7687	.8341	.8925
alle Variablen	.8577	.8728	.9215

**DAS Skala: Ärger**

	wütend		ärgerlich		zornig		Ärger	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbsttraining	0,70	0,70	1,93	0,74	1,49	0,57	5,10	1,75
Therapeut, weibl. Selbsttraining	0,60	0,60	1,68	0,72	1,51	0,55	4,96	1,43
Therapeut, männl. Fremdraining	0,79	0,79	2,47	0,81	2,13	0,84	6,76	2,24
Therapeut, weibl. Fremdraining	0,88	0,88	2,49	0,90	1,95	0,92	4,02	3,42
Patient, männl. Selbsttraining	1,00	1,00	1,93	1,16	1,90	1,01	5,66	3,09
Patient, weibl. Selbsttraining	1,12	1,12	2,03	1,18	1,88	1,08	5,99	3,23
Patient, männl. Fremdraining	0,74	0,74	1,83	0,97	1,45	0,87	4,63	2,37
Patient, weibl. Fremdraining	0,59	0,59	1,47	0,68	1,31	0,50	3,73	2,16

**DAS Skala: Ekel**

	angewidert		angeekelt		abgestoßen		Ekel	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbsttraining	0,71	0,71	1,24	0,51	1,32	0,60	4,00	1,62
Therapeut, weibl. Selbsttraining	0,73	0,73	1,20	0,40	1,49	0,75	4,31	1,44
Therapeut, männl. Fremdraining	0,68	0,68	1,82	0,66	1,87	0,73	5,58	1,80
Therapeut, weibl. Fremdraining	0,74	0,74	1,73	0,63	1,90	0,70	3,39	2,84
Patient, männl. Selbsttraining	0,83	0,83	1,55	0,78	1,62	0,78	4,69	2,16
Patient, weibl. Selbsttraining	0,87	0,87	1,32	0,63	1,56	0,87	4,56	2,27
Patient, männl. Fremdraining	0,68	0,68	1,28	0,53	1,28	0,59	3,83	1,76
Patient, weibl. Fremdraining	0,58	0,58	1,21	0,43	1,34	0,54	3,50	1,91

**DAS Skala: Freude**

	vergnügt		erfreut		fröhlich		Freude	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbsttraining	0,64	0,64	2,77	0,80	2,47	0,70	7,80	1,82
Therapeut, weibl. Selbsttraining	0,61	0,61	2,34	0,69	2,10	0,62	6,50	1,56
Therapeut, männl. Fremdraining	0,78	0,78	2,50	0,75	2,36	0,74	7,21	2,22
Therapeut, weibl. Fremdraining	0,77	0,77	1,83	0,59	1,83	0,70	3,39	2,97
Patient, männl. Selbsttraining	0,99	0,99	2,79	1,08	2,66	1,01	7,90	2,90
Patient, weibl. Selbsttraining	0,88	0,88	2,23	0,90	2,17	0,94	6,46	2,63
Patient, männl. Fremdraining	0,68	0,68	2,59	0,78	2,62	0,82	7,53	2,45
Patient, weibl. Fremdraining	0,82	0,82	2,34	0,81	2,45	0,90	6,27	3,29

**DAS Skala: Angst**

	eingeschränkt		ängstlich		furchtsam		Angst	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbsttraining	0,80	0,80	1,71	0,60	1,61	0,56	5,59	1,58
Therapeut, weibl. Selbsttraining	0,67	0,67	1,44	0,55	1,49	0,55	5,42	1,24
Therapeut, männl. Fremdraining	0,71	0,71	2,70	0,81	2,63	0,72	7,73	1,92
Therapeut, weibl. Fremdraining	0,97	0,97	2,54	1,14	2,51	1,08	4,71	4,18
Patient, männl. Selbsttraining	1,00	1,00	1,97	1,05	1,90	1,08	6,14	2,89
Patient, weibl. Selbsttraining	0,99	0,99	2,28	1,09	2,03	1,09	6,76	2,57
Patient, männl. Fremdraining	0,91	0,91	1,21	0,49	1,07	0,26	3,90	1,37
Patient, weibl. Fremdraining	0,73	0,73	1,30	0,50	1,27	0,50	3,60	2,03

**DAS Skala: Interesse**

	aufmerksam		konzentriert		wach		Interesse	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD

	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbststrat.	0,75	3,54	0,75	3,39	0,81	10,52	2,06	
Therapeut, weibl. Selbststrat.	0,69	3,85	0,76	3,71	0,75	11,88	1,51	
Therapeut, männl. Fremdstrat.	0,65	3,62	0,72	3,67	0,58	10,83	2,02	
Therapeut, weibl. Fremdstrat.	0,68	3,44	0,67	3,39	0,67	7,10	5,55	
Patient, männl. Selbststrat.	0,82	3,55	0,91	3,62	0,68	11,14	2,08	
Patient, weibl. Selbststrat.	0,67	3,93	0,63	3,81	0,66	11,67	1,64	
Patient, männl. Fremdstrat.	0,73	3,72	0,84	3,90	0,67	11,43	2,84	
Patient, weibl. Fremdstrat.	0,57	4,12	0,55	3,90	0,70	10,51	4,32	

### DAS Skala: Scham

	gehemmt		verschämt		verlegen		Scham	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbststrat.	0,72	1,71	0,69	1,97	0,65	5,77	1,58	
Therapeut, weibl. Selbststrat.	0,62	1,34	0,48	1,51	0,51	5,00	1,36	
Therapeut, männl. Fremdstrat.	0,73	2,83	0,76	2,89	0,77	8,22	1,99	
Therapeut, weibl. Fremdstrat.	0,97	2,46	0,95	2,39	0,83	4,27	3,75	
Patient, männl. Selbststrat.	1,05	1,97	0,94	2,14	0,83	6,21	2,55	
Patient, weibl. Selbststrat.	0,96	2,36	1,04	2,55	0,97	7,94	2,41	
Patient, männl. Fremdstrat.	0,82	1,21	0,41	1,66	0,77	4,67	1,65	
Patient, weibl. Fremdstrat.	0,67	1,20	0,50	1,33	0,64	3,49	2,05	

### DAS Skala: Schuld

	reumütig		schuldig		tadelnswert		Schuld	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbststrat.	0,55	1,59	0,66	1,72	0,69	4,69	1,44	
Therapeut, weibl. Selbststrat.	0,43	1,37	0,49	1,44	0,59	4,38	1,42	
Therapeut, männl. Fremdstrat.	0,76	2,53	0,76	2,25	0,87	6,76	2,09	
Therapeut, weibl. Fremdstrat.	0,82	2,61	0,92	2,54	0,95	4,59	3,90	
Patient, männl. Selbststrat.	0,74	1,76	0,95	1,66	0,81	4,86	2,37	
Patient, weibl. Selbststrat.	0,88	1,88	0,93	1,71	0,90	5,68	2,44	
Patient, männl. Fremdstrat.	0,51	1,10	0,31	1,03	0,19	3,27	1,01	
Patient, weibl. Fremdstrat.	0,40	1,13	0,41	1,15	0,40	2,98	1,55	

### DAS Skala: Trauer

	niedergeschlagen		traurig		entmutigt		Trauer	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbststrat.	0,71	1,78	0,79	1,68	0,73	5,34	1,96	
Therapeut, weibl. Selbststrat.	0,72	1,98	0,82	1,66	0,66	5,88	1,34	
Therapeut, männl. Fremdstrat.	0,80	2,91	0,93	2,18	0,75	7,01	2,22	
Therapeut, weibl. Fremdstrat.	1,08	2,78	1,19	2,32	0,85	5,07	4,39	
Patient, männl. Selbststrat.	1,05	2,24	0,99	1,69	0,89	5,90	2,66	
Patient, weibl. Selbststrat.	1,05	2,67	1,20	2,10	0,92	7,35	2,68	
Patient, männl. Fremdstrat.	0,88	1,62	0,78	1,38	0,68	4,57	2,05	
Patient, weibl. Fremdstrat.	0,50	1,40	0,56	1,47	0,57	3,62	1,91	

### DAS Skala: Überraschung

	überrascht		erstaunt		verblüfft		Überraschung	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbststrat.	0,78	2,59	0,72	2,25	0,65	7,55	1,86	
Therapeut, weibl. Selbststrat.	0,72	2,39	0,80	2,20	0,78	6,85	1,67	
Therapeut, männl. Fremdstrat.	0,73	2,83	0,81	2,71	0,75	8,32	2,16	
Therapeut, weibl. Fremdstrat.	0,95	2,46	0,87	2,41	0,92	4,44	3,75	
Patient, männl. Selbststrat.	0,95	2,10	0,77	2,00	0,76	6,59	2,10	

Patient, weibl. Selbststrat.	2,62	1,20	2,52	1,11	2,17	1,02	7,72	2,93
Patient, männl. Fremdstrat.	2,28	0,65	2,28	0,75	1,69	0,66	6,03	1,92
Patient, weibl. Fremdstrat.	2,39	0,84	2,28	0,83	1,84	0,80	5,87	2,90

### DAS Skala: Verachtung

	verachtungsvoll		spöttisch		geringschätzend		Verachtung	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapeut, männl. Selbststrat.	1,56	0,56	1,80	0,78	1,33	0,63	4,44	1,58
Therapeut, weibl. Selbststrat.	1,56	0,74	1,71	0,72	1,68	0,76	4,77	1,50
Therapeut, männl. Fremdstrat.	2,01	0,87	1,92	0,60	1,88	0,74	5,74	1,77
Therapeut, weibl. Fremdstrat.	2,00	0,87	1,59	0,67	2,10	0,70	3,29	2,69
Patient, männl. Selbststrat.	1,62	0,73	1,83	0,76	1,90	0,86	5,34	1,63
Patient, weibl. Selbststrat.	1,66	0,90	1,42	0,69	1,77	0,87	5,00	2,01
Patient, männl. Fremdstrat.	1,84	0,72	1,79	0,77	1,34	0,61	4,33	1,75
Patient, weibl. Fremdstrat.	1,30	0,95	1,31	0,52	1,28	0,45	3,50	1,83

## Affektives Erleben im Alltag ( Standardisiertes Tagebuch)

### Instruktion

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf standardisierte Tagebücher, die von 10 Patienten therapiebegleitend geführt wurden. Die D

*DAS Instruktion (Standardisiertes Tagebuch)*

Das ist eine Liste von Wörtern mit denen man bestimmte Gefühle und Reaktionen beschreiben kann. Gehen Sie alle Wörter d

### DAS Reliabilitäten und Anzahl Tage pro Patient

DAS-Skala			Therapie	N Tage
Interesse	.8204		Therapie 01	123
Freude	.8549		Therapie 02	199
Überraschung	.9159		Therapie 03	142
Trauer	.6875		Therapie 04	126
Ärger	.9285		Therapie 05	184
Ekel	.8800		Therapie 07	53
Verachtung	.8156		Therapie 08	180
Angst	.5800		Therapie 09	151
Scham	.8095		Therapie 21	42
Schuld	.8881		Therapie 24	70
alle Variablen	.9177			

### DAS Skala: Ärger

	wütend		ärgerlich		zornig		Ärger	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	2,14	1,17	2,85	1,02	1,99	1,21	6,98	3,13
Therapie 02	1,28	0,64	1,87	0,99	1,23	0,61	4,38	1,92
Therapie 03	2,56	0,73	2,58	0,72	2,43	0,74	7,57	4,29
Therapie 04	2,30	1,53	2,79	1,43	2,13	1,53	7,22	4,29
Therapie 05	1,06	0,38	1,07	0,44	1,03	0,31	3,16	1,06
Therapie 07	2,90	0,85	2,98	0,76	2,72	0,67	8,64	1,94
Therapie 08	2,54	0,79	2,66	0,72	2,37	0,74	7,57	2,02
Therapie 09	1,29	0,82	2,07	1,21	1,15	0,63	4,50	2,31
Therapie 21	2,59	1,07	2,56	0,98	2,59	1,09	7,73	2,96
Therapie 24	3,43	0,84	3,57	0,80	3,51	0,80	10,51	2,30

### DAS Skala: Ekel

	angewidert		angekelt		abgestoßen		Ekel	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	1,43	0,68	1,13	0,42	1,56	0,81	4,12	1,59
Therapie 02	1,36	0,66	1,30	0,65	1,24	0,60	3,90	1,73
Therapie 03	2,31	0,62	2,08	0,61	2,42	0,63	6,81	1,61
Therapie 04	1,83	0,97	1,66	0,94	1,89	1,06	5,39	2,66
Therapie 05	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
Therapie 07	2,65	0,87	2,24	0,47	2,37	0,63	7,25	1,61
Therapie 08	1,68	0,73	1,50	0,66	2,21	0,65	5,40	1,68
Therapie 09	1,41	0,90	1,34	0,92	2,24	1,46	4,99	2,83
Therapie 21	2,05	0,67	2,05	0,74	2,41	1,14	6,51	2,36
Therapie 24	2,98	0,91	2,76	0,95	3,10	0,92	8,81	2,51

### DAS Skala: Freude

	vergnügt		erfreut		fröhlich		Freude	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	3,61	0,78	3,34	0,83	3,38	0,79	10,30	2,17
Therapie 02	2,51	0,67	2,14	0,83	2,25	0,74	6,89	1,87
Therapie 03	2,75	0,53	2,60	0,56	2,65	0,52	8,01	1,37
Therapie 04	3,19	0,78	2,96	0,84	3,05	0,83	9,20	2,14
Therapie 05	2,81	0,67	3,02	0,60	3,03	0,60	8,86	1,70
Therapie 07	3,04	0,49	2,94	0,54	2,94	0,42	8,92	1,15
Therapie 08	3,36	0,55	3,65	0,60	3,37	0,57	10,38	1,43
Therapie 09	2,20	1,06	3,38	0,80	2,68	0,94	8,26	2,38
Therapie 21	2,41	0,59	2,41	0,63	2,37	0,70	7,20	1,69
Therapie 24	3,08	0,79	3,21	0,79	3,17	0,77	9,46	2,30

### DAS Skala: Angst

	eingeschränkt		ängstlich		furchtsam		Verachtung	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	2,00	0,62	1,31	0,58	1,16	0,46	7,21	2,39
Therapie 02	3,19	0,93	2,52	0,82	1,39	0,68	4,99	1,57
Therapie 03	2,31	0,49	2,71	0,63	2,50	0,54	6,84	1,54
Therapie 04	2,95	0,90	2,80	0,95	2,53	1,07	6,33	2,23
Therapie 05	1,01	0,10	2,56	0,86	1,07	0,33	3,02	0,17
Therapie 07	2,51	0,61	3,45	0,78	3,18	0,62	6,61	1,10
Therapie 08	2,75	0,68	2,28	0,53	2,13	0,37	6,36	1,26
Therapie 09	3,03	1,16	1,90	0,96	1,60	0,96	4,33	1,68
Therapie 21	2,20	0,81	2,27	0,90	2,15	0,61	5,27	1,23
Therapie 24	3,00	0,72	3,35	0,92	3,27	0,91	8,85	2,35

### DAS Skala: Interesse

	aufmerksam		konzentriert		wach		Interesse	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	4,01	0,51	3,92	0,41	3,83	0,54	11,76	1,15
Therapie 02	3,44	0,52	3,32	0,48	3,48	0,50	10,25	1,19
Therapie 03	3,03	0,40	2,84	0,44	2,87	0,42	8,74	1,07
Therapie 04	4,04	0,75	3,93	0,79	3,21	0,92	11,18	2,15
Therapie 05	3,44	0,57	3,42	0,59	3,17	0,58	10,03	1,48
Therapie 07	3,12	0,33	3,04	0,34	3,02	0,24	9,18	0,62
Therapie 08	3,74	0,68	3,69	0,61	3,68	0,52	11,13	1,59
Therapie 09	4,05	0,76	3,70	0,89	3,94	0,87	11,65	1,91
Therapie 21	2,95	0,44	2,68	0,57	2,85	0,65	8,49	1,33
Therapie 24	3,51	0,64	3,51	0,64	3,48	0,59	10,49	1,74

### DAS Skala: Scham

	gehemmt		verschämt		verlegen		Scham	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	1,59	0,55	1,11	0,40	1,44	0,66	4,15	1,29
Therapie 02	2,63	0,85	1,51	0,76	1,35	0,75	5,49	1,91
Therapie 03	2,39	0,51	2,27	0,45	2,22	0,48	6,88	1,17
Therapie 04	2,18	0,97	1,20	0,51	2,01	0,87	5,39	1,91
Therapie 05	1,37	0,73	1,00	0,00	1,23	0,59	3,60	1,26
Therapie 07	2,55	0,50	2,88	0,55	3,00	0,40	8,44	0,97
Therapie 08	2,38	0,57	2,12	0,51	2,21	0,46	6,71	1,17
Therapie 09	1,48	0,79	1,08	0,33	1,38	0,67	3,94	1,48
Therapie 21	2,24	0,62	2,00	0,59	1,95	0,50	6,20	1,38
Therapie 24	3,08	0,73	3,03	0,88	2,85	0,87	8,94	2,12

**DAS Skala: Schuld**

	reumütig		schuldig		tadelnswert		Schuld	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	1,09	0,43	1,11	0,42	1,43	0,65	3,64	1,23
Therapie 02	2,10	0,86	1,77	0,85	2,35	0,79	6,23	2,09
Therapie 03	2,35	0,54	2,58	0,60	2,14	0,42	7,07	1,20
Therapie 04	1,05	0,31	1,03	0,22	1,10	0,37	3,18	0,67
Therapie 05	1,02	0,22	1,09	0,49	1,00	0,00	3,11	0,65
Therapie 07	2,59	0,67	2,63	0,53	2,57	0,57	7,78	1,42
Therapie 08	2,03	0,48	2,38	0,57	2,21	0,44	6,62	1,13
Therapie 09	1,20	0,56	1,02	0,12	1,23	0,60	3,45	0,98
Therapie 21	2,32	0,99	2,37	1,13	2,20	0,95	6,88	2,96
Therapie 24	2,51	0,67	2,63	0,70	2,53	0,80	7,69	1,78

**DAS Skala: Trauer**

	niedergeschlagen		traurig		entmtigt		Trauer	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	2,24	0,91	2,36	0,84	1,63	0,69	6,23	2,20
Therapie 02	2,01	0,84	1,65	0,96	2,94	0,90	6,60	2,15
Therapie 03	3,01	0,80	2,88	0,74	2,43	0,53	8,32	1,65
Therapie 04	2,26	1,18	2,01	1,11	1,50	0,84	5,77	2,78
Therapie 05	1,20	0,53	1,57	0,84	2,92	1,53	5,69	2,10
Therapie 07	3,06	0,70	3,16	0,54	2,86	0,69	9,08	1,64
Therapie 08	2,45	0,69	2,64	0,71	2,18	0,41	7,28	1,48
Therapie 09	2,85	1,14	2,68	1,09	2,62	1,02	8,15	2,93
Therapie 21	2,07	0,91	2,49	1,00	2,24	0,83	6,80	2,55
Therapie 24	3,21	1,02	3,68	0,91	2,95	0,87	9,84	2,44

**DAS Skala: Überraschung**

	überrascht		erstaunt		verblüfft		Überraschung	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	2,73	0,80	2,89	0,69	2,40	0,70	7,72	1,94
Therapie 02	1,22	0,64	1,30	0,69	1,22	0,60	3,73	1,66
Therapie 03	2,56	0,54	2,43	0,53	2,38	0,54	7,37	1,34
Therapie 04	2,55	1,20	2,40	1,24	1,58	0,97	6,53	2,94
Therapie 05	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
Therapie 07	3,06	0,54	2,90	0,36	2,80	0,40	8,78	0,82
Therapie 08	3,36	0,73	3,40	0,68	2,92	0,68	9,68	1,76
Therapie 09	1,60	0,93	1,62	0,89	1,27	0,69	4,50	1,78
Therapie 21	1,71	0,51	1,83	0,63	1,71	0,56	5,24	1,39
Therapie 24	2,78	0,87	2,78	0,85	2,81	0,90	8,37	2,52

**DAS Skala: Verachtung**

	verachtungsvoll		spöttisch		geringschätzend		Verachtung	
Therapie	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Therapie 01	2,01	0,93	2,87	0,83	2,33	0,88	7,21	2,39
Therapie 02	1,61	0,81	1,04	0,22	2,34	0,87	4,99	1,57
Therapie 03	2,40	0,70	2,20	0,61	2,25	0,47	6,84	1,54
Therapie 04	1,99	0,96	2,03	0,86	2,31	0,92	6,33	2,23
Therapie 05	1,00	0,00	1,00	0,00	1,02	0,17	3,02	0,17
Therapie 07	2,31	0,65	2,06	0,37	2,24	0,51	6,61	1,10
Therapie 08	2,02	0,59	2,16	0,50	2,18	0,48	6,36	1,26
Therapie 09	1,38	0,77	1,08	0,29	1,89	0,96	4,33	1,68

Therapie 21	2,00	0,63	1,44	0,50	1,83	0,63	5,27	1,23
Therapie 24	2,20	0,81	2,27	0,90	2,15	0,61	8,85	2,35

## FREMDRATINGS

DAS-Skala	
Interesse	.7996
Freude	.8583
Überraschung	.7988
Trauer	.6491
Ärger	.8306
Ekel	.8138
Verachtung	.5959
Angst	.7548
Scham	.7124
Schuld	.4089
insgesamt	.7817

**DAS Skala: Ärger**

Gruppe	N	zornig		wütend		ärgerlich		Ärger	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,14	0,45	1,14	0,47	1,22	0,52	3,47	1,24
Schizophrene	20	1,05	0,22	1,15	0,49	1,15	0,37	3,35	0,67
Interaktionspartner	20	1,05	0,22	1,10	0,45	1,20	0,70	3,35	1,35
- ambulante Sci.	10	1,00	0,00	1,20	0,63	1,30	0,48	3,50	0,71
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
- hospitalisierte Sci.	10	1,10	0,32	1,10	0,32	1,00	0,00	3,20	0,63
- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,20	0,63	1,40	0,97	3,70	1,89
Psychosomatiker	30	1,17	0,38	1,17	0,59	1,31	0,54	3,59	1,24
Interaktionspartner	30	1,13	0,57	1,10	0,40	1,23	0,63	3,47	1,50
- Wirbelsäule	10	1,40	0,52	1,40	0,97	1,50	0,71	4,30	1,89
- Interaktionspartner	10	1,40	0,97	1,30	0,67	1,50	0,97	4,20	2,49
- Colitis	20	1,05	0,22	1,05	0,22	1,21	0,42	3,21	0,42
- Interaktionspartner	20	1,00	0,00	1,00	0,00	1,10	0,31	3,10	0,31
-- Colitis, männlich	10	1,10	0,32	1,10	0,32	1,22	0,44	3,22	0,44
-- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,10	0,32	3,10	0,32
-- Colitis, weiblich	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,20	0,42	3,20	0,42
-- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,10	0,32	3,10	0,32
Kontrollgruppe	40	1,20	0,56	1,15	0,43	1,18	0,38	3,53	1,24
KG, männlich	20	1,30	0,73	1,25	0,55	1,25	0,44	3,80	1,54
- KG, weiblich	20	1,10	0,31	1,05	0,22	1,10	0,31	3,25	0,79

**DAS Skala: Ekel**

Gruppe	N	angeekelt		abgestoßen		angewidert		Ekel	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,09	0,41	1,08	0,34	1,06	0,34	3,24	0,94
Schizophrene	20	1,20	0,52	1,05	0,22	1,15	0,49	3,40	1,05
Interaktionspartner	20	1,10	0,45	1,00	0,00	1,05	0,22	3,15	0,49
- ambulante Sci.	10	1,30	0,67	1,10	0,32	1,20	0,63	3,60	1,35
- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,10	0,32
- hospitalisierte Sci.	10	1,10	0,32	1,00	0,00	1,10	0,32	3,20	0,63
- Interaktionspartner	10	1,20	0,63	1,00	0,00	1,00	0,00	3,20	0,63
Psychosomatiker	30	1,17	0,59	1,13	0,35	1,14	0,58	3,45	1,43
Interaktionspartner	30	1,07	0,37	1,10	0,55	1,03	0,18	3,20	1,10
- Wirbelsäule	10	1,40	0,97	1,30	0,48	1,30	0,95	4,00	2,21
- Interaktionspartner	10	1,20	0,63	1,30	0,95	1,10	0,32	3,60	1,90
- Colitis	20	1,05	0,22	1,05	0,22	1,05	0,23	3,16	0,69
- Interaktionspartner	20	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
--Colitis, männlich	10	1,10	0,32	1,10	0,32	1,11	0,33	3,33	1,00
-- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
-- Colitis, weiblich	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
--Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
Kontrollgruppe	40	1,00	0,00	1,08	0,27	1,00	0,00	3,08	0,27
- KG, männlich	20	1,00	0,00	1,05	0,22	1,00	0,00	3,05	0,22
- KG, weiblich	20	1,00	0,00	1,10	0,31	1,00	0,00	3,10	0,31

**DAS Skala: Freude**

Gruppe	N	fröhlich		vergnügt		erfreut		Freude	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	2,36	0,94	2,42	0,88	2,37	0,92	7,14	2,41
Schizophrene	20	2,65	0,88	2,65	0,88	2,65	0,93	7,95	2,42
Interaktionspartner	20	2,00	0,92	2,05	0,89	2,15	0,81	6,20	2,14
- ambulante Sci.	10	2,50	0,97	2,50	0,85	2,40	0,97	7,40	2,37
- Interaktionspartner	10	2,20	1,03	2,20	0,92	2,30	0,82	6,70	2,36
- hospitalisierte Sci.	10	2,80	0,79	2,80	0,92	2,90	0,88	8,50	2,46
- Interaktionspartner	10	1,80	0,79	1,90	0,88	2,00	0,82	5,70	1,89
Psychosomatiker	30	2,50	0,82	2,53	0,78	2,30	0,88	7,33	2,19
-Interaktionspartner	30	2,27	1,05	2,31	0,81	2,33	1,09	6,83	2,49
- Wirbelsäule	10	2,40	1,07	2,40	0,97	2,20	1,03	7,00	2,79
- Interaktionspartner	10	1,90	1,10	2,00	0,82	2,30	1,16	6,20	2,78
- Colitis	20	2,55	0,69	2,60	0,68	2,35	0,81	7,50	1,88
- Interaktionspartner	20	2,45	1,00	2,47	0,77	2,35	1,09	7,16	2,34
--Colitis, männlich	10	2,40	0,70	2,60	0,70	2,40	0,84	7,40	2,07
-- Interaktionspartner	10	2,40	0,70	2,56	0,73	2,60	0,84	7,33	1,94
-- Colitis, weiblich	10	2,70	0,67	2,60	0,70	2,30	0,82	7,60	1,78
--Interaktionspartner	10	2,50	1,27	2,40	0,84	2,10	1,29	7,00	2,75
Kontrollgruppe	40	2,37	0,95	2,50	0,96	2,42	0,87	7,30	2,56
- KG, männlich	20	2,40	0,99	2,45	1,00	2,40	0,94	7,25	2,75
- KG, weiblich	20	2,35	0,93	2,55	0,94	2,45	0,83	7,35	2,43

**DAS Skala: Angst**

Gruppe	N	ängstlich		furchtsam		eingeschränkt		Angst	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,51	0,76	1,33	0,63	1,61	0,88	4,46	1,88
Schizophrene	20	1,35	0,49	1,35	0,49	1,65	0,75	4,35	1,27
Interaktionspartner	20	1,95	1,10	1,65	0,93	1,70	1,13	5,30	2,77
- ambulante Sci.	10	1,30	0,48	1,30	0,48	1,60	0,70	4,20	1,03
- Interaktionspartner	10	1,50	0,71	1,30	0,48	1,30	0,67	4,10	1,60
- hospitalisierte Sci.	10	1,40	0,52	1,40	0,52	1,70	0,82	4,50	1,51
- Interaktionspartner	10	2,40	1,26	2,00	1,15	2,10	1,37	6,50	3,24
Psychosomatiker	30	1,40	0,62	1,23	0,57	1,60	0,72	4,23	1,41
Interaktionspartner	30	1,57	0,73	1,30	0,53	1,80	1,00	4,67	1,65
- Wirbelsäule	10	1,40	0,70	1,30	0,48	1,80	0,79	4,60	1,84
- Interaktionspartner	10	1,30	0,48	1,40	0,70	1,50	0,53	4,20	1,14
- Colitis	20	1,40	0,68	1,15	0,37	1,50	0,69	4,05	1,15
- Interaktionspartner	20	1,70	0,80	1,25	0,44	1,95	1,15	4,90	1,83
--Colitis, männlich	10	1,40	0,70	1,30	0,48	1,80	0,79	4,50	1,18
-- Interaktionspartner	10	1,70	0,95	1,20	0,42	1,80	1,03	4,70	1,83
-- Colitis, weiblich	10	1,40	0,70	1,00	0,00	1,20	0,42	3,60	0,97
--Interaktionspartner	10	1,70	0,67	1,30	0,48	2,10	1,29	5,10	1,91
Kontrollgruppe	40	1,43	0,75	1,25	0,59	1,42	0,81	4,10	1,98
- KG, männlich	20	1,50	0,76	1,30	0,66	1,60	0,99	4,40	2,26
- KG, weiblich	20	1,35	0,75	1,20	0,52	1,25	0,55	3,80	1,67

**DAS Skala: Interesse**

Gruppe	N	wach		aufmerksam		konzentriert		Interesse	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	3,84	0,79	3,98	0,68	3,93	0,83	11,75	1,96
Schizophrene	20	4,00	0,56	4,15	0,49	4,20	0,62	12,35	1,35
Interaktionspartner	20	3,45	1,00	3,85	0,59	3,70	0,92	11,00	2,05
- ambulante Sci.	10	4,10	0,57	4,10	0,32	4,20	0,42	12,40	1,07
- Interaktionspartner	10	3,50	0,53	3,70	0,48	3,60	0,52	10,80	1,23
- hospitalisierte Sci.	10	3,90	0,57	4,20	0,63	4,20	0,79	12,30	1,64
- Interaktionspartner	10	3,40	1,35	4,00	0,67	3,80	1,23	11,20	2,70
Psychosomatiker	30	3,87	0,73	3,83	0,75	3,83	0,91	11,53	2,10
Interaktionspartner	30	3,77	0,97	4,03	0,61	3,93	0,91	11,73	2,12
- Wirbelsäule	10	3,90	0,74	3,40	1,07	3,90	0,99	11,20	2,53
- Interaktionspartner	10	3,80	0,63	3,90	0,57	3,60	0,97	11,30	2,11
- Colitis	20	3,85	0,75	4,05	0,39	3,80	0,89	11,70	1,89
- Interaktionspartner	20	3,75	1,12	4,10	0,64	4,10	0,85	11,95	2,14
--Colitis, männlich	10	3,80	0,79	4,00	0,47	3,60	1,07	11,40	2,27
-- Interaktionspartner	10	3,90	1,29	4,20	0,63	4,40	0,70	12,50	1,96
-- Colitis, weiblich	10	3,90	0,74	4,10	0,32	4,00	0,67	12,00	1,49
--Interaktionspartner	10	3,60	0,97	4,00	0,67	3,80	0,92	11,40	2,27
Kontrollgruppe	40	4,00	0,60	4,03	0,80	3,97	0,73	12,00	1,88
- KG, männlich	20	3,75	0,44	3,70	0,92	3,65	0,67	11,10	1,80
- KG, weiblich	20	4,25	0,64	4,35	0,49	4,30	0,66	12,90	1,52

**DAS Skala: Scham**

Gruppe	N	verschämt		verlegen		blöd		Scham	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,34	0,67	1,77	0,85	1,19	0,54	4,30	1,68
Schizophrene	20	1,35	0,67	1,70	0,73	1,15	0,37	4,20	1,40
Interaktionspartner	20	1,75	1,02	2,35	1,14	1,45	0,83	5,55	2,56
- ambulante Sci.	10	1,10	0,32	1,50	0,71	1,10	0,32	3,70	1,06
- Interaktionspartner	10	1,50	0,71	2,30	1,06	1,30	0,67	5,10	1,85
- hospitalisierte Sci.	10	1,60	0,84	1,90	0,74	1,20	0,42	4,70	1,57
- Interaktionspartner	10	2,00	1,25	2,40	1,26	1,60	0,97	6,00	3,16
Psychosomatiker	30	1,23	0,50	1,60	0,56	1,10	0,31	3,93	1,14
Interaktionspartner	30	1,43	0,73	1,90	0,92	1,17	0,46	4,50	1,76
- Wirbelsäule	10	1,30	0,67	1,50	0,53	1,30	0,48	4,10	1,29
- Interaktionspartner	10	1,40	0,70	1,90	0,88	1,30	0,67	4,60	2,01
- Colitis	20	1,20	0,41	1,65	0,59	1,00	0,00	3,84	0,90
- Interaktionspartner	20	1,45	0,76	1,90	0,97	1,10	0,31	4,45	1,67
--Colitis, männlich	10	1,30	0,48	1,70	0,48	1,00	0,00	4,00	0,87
-- Interaktionspartner	10	1,30	0,67	1,70	0,82	1,10	0,32	4,10	1,60
-- Colitis, weiblich	10	1,10	0,32	1,60	0,70	1,00	0,00	3,70	0,95
--Interaktionspartner	10	1,60	0,84	2,10	1,10	1,10	0,32	4,80	1,75
Kontrollgruppe	40	1,13	0,40	1,55	0,75	1,18	0,59	3,85	1,25
- KG, männlich	20	1,15	0,49	1,65	0,88	1,30	0,80	4,10	1,48
- KG, weiblich	20	1,10	0,31	1,45	0,60	1,05	0,22	3,60	0,94

**DAS Skala: Schuld**

Gruppe	N	schuldig		tadelnswert		reumütig		Schuld	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,07	0,29	1,20	0,55	1,13	0,48	3,41	0,93
Schizophrene	20	1,05	0,22	1,20	0,41	1,26	0,73	3,53	0,96
Interaktionspartner	20	1,20	0,52	1,30	0,80	1,05	0,22	3,55	1,15
- ambulante	10	1,00	0,00	1,10	0,32	1,30	0,95	3,40	0,97
- Interaktionspartner	10	1,20	0,63	1,20	0,63	1,10	0,32	3,50	1,27
- hospitalisierte	10	1,10	0,32	1,30	0,48	1,22	0,44	3,67	1,00
- Interaktionspartner	10	1,20	0,42	1,40	0,97	1,00	0,00	3,60	1,07
Psychosomatischer	30	1,03	0,19	1,27	0,74	1,03	0,19	3,34	0,81
Interaktionspartner	30	1,03	0,18	1,13	0,35	1,20	0,55	3,37	0,85
- Wirbelsäule	10	1,00	0,00	1,70	1,16	1,00	0,00	3,70	1,16
- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,20	0,42	1,30	0,67	3,60	1,07
- Colitis	20	1,05	0,23	1,05	0,22	1,05	0,23	3,16	0,50
- Interaktionspartner	20	1,00	0,00	1,10	0,31	1,15	0,49	3,25	0,67
--Colitis, männlich	10	1,00	0,00	1,10	0,32	1,11	0,33	3,27	0,72
-- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,10	0,32	1,00	0,00	3,10	0,32
-- Colitis, weiblich	10	1,10	0,32	1,00	0,00	1,00	0,00	3,10	0,32
--Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,10	0,32	1,30	0,67	3,40	0,97
Kontrollgruppe	40	1,08	0,27	1,15	0,43	1,13	0,52	3,35	0,95
- KG, männlich	20	1,15	0,37	1,15	0,49	1,25	0,72	3,55	1,28
- KG, weiblich	20	1,00	0,00	1,15	0,37	1,00	0,00	3,15	0,37

**DAS Skala: Trauer**

Gruppe	N	entmutigt		niedergeschlagen		traurig		Trauer	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,36	0,74	1,23	0,51	1,16	0,44	3,75	1,35
Schizophrene	20	1,40	0,68	1,40	0,50	1,40	0,68	4,20	1,47
Interaktionspartner	20	1,95	1,23	1,40	0,68	1,30	0,47	4,65	1,98
- ambulante Sci.	10	1,40	0,70	1,30	0,48	1,00	0,00	4,10	1,66
- Interaktionspartner	10	1,60	0,97	1,20	0,42	1,20	0,42	4,00	1,41
- hospitalisierte Sci.	10	1,40	0,70	1,50	0,53	1,40	0,52	4,30	1,34
- Interaktionspartner	10	2,30	1,42	1,60	0,84	1,40	0,52	5,30	2,31
Psychosomatiker	30	1,23	0,50	1,23	0,57	1,07	0,25	3,53	1,14
Interaktionspartner	30	1,33	0,66	1,17	0,46	1,10	0,40	3,60	1,25
- Wirbelsäule	10	1,50	0,71	1,40	0,70	1,10	0,32	4,00	1,33
- Interaktionspartner	10	1,40	0,70	1,30	0,67	1,20	0,63	3,90	1,85
- Colitis	20	1,10	0,31	1,15	0,49	1,05	0,22	3,30	0,98
- Interaktionspartner	20	1,30	0,66	1,10	0,31	1,05	0,22	3,45	0,83
--Colitis, männlich	10	1,20	0,42	1,30	0,67	1,10	0,32	3,60	1,35
-- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,00	0,00	1,00	0,00	3,10	0,32
-- Colitis, weiblich	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
--Interaktionspartner	10	1,50	0,85	1,20	0,42	1,10	0,32	3,80	1,03
Kontrollgruppe	40	1,15	0,48	1,10	0,38	1,10	0,38	3,35	0,80
- KG, männlich	20	1,25	0,64	1,20	0,52	1,20	0,52	3,65	1,04
- KG, weiblich	20	1,05	0,22	1,00	0,00	1,00	0,00	3,05	0,22

**DAS Skala: Überraschung**

Gruppe	N	verblüfft		überrascht		erstaunt		Überraschung	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,76	0,88	2,20	1,08	2,14	0,97	6,10	2,48
Schizophrene	20	1,95	0,94	2,10	1,02	2,20	0,89	6,25	2,59
Interaktionspartner	20	2,10	1,25	2,75	1,29	2,50	1,19	6,20	2,14
- ambulante Sci.	10	1,70	0,67	2,10	0,88	1,90	0,74	5,70	1,95
- Interaktionspartner	10	1,90	1,10	2,70	1,42	2,50	1,18	7,10	3,38
- hospitalisierte Sci.	10	2,20	1,14	2,10	1,20	2,50	0,97	6,80	3,12
- Interaktionspartner	10	2,30	1,42	2,80	1,23	2,50	1,27	7,60	3,63
Psychosomatiker	30	1,70	0,70	2,27	1,08	2,17	0,91	6,13	2,03
Interaktionspartner	30	1,73	0,83	2,33	1,09	2,37	1,07	6,43	2,53
- Wirbelsäule	10	1,60	0,52	2,10	1,10	1,90	0,88	5,60	1,78
- Interaktionspartner	10	1,70	0,82	2,50	1,08	2,60	1,07	6,80	2,74
- Colitis	20	1,75	0,79	2,35	1,09	2,30	0,92	6,40	2,14
- Interaktionspartner	20	1,75	0,85	2,25	1,12	2,25	1,07	6,25	2,47
--Colitis, männlich	10	1,80	0,63	2,20	0,92	2,10	0,74	6,10	1,52
-- Interaktionspartner	10	1,60	0,70	2,50	1,08	2,10	0,88	6,20	1,87
-- Colitis, weiblich	10	1,70	0,95	2,50	1,27	2,50	1,08	6,70	2,67
--Interaktionspartner	10	1,90	0,99	2,00	1,15	2,40	1,26	6,30	3,06
Kontrollgruppe	40	1,58	0,75	1,82	0,87	1,72	0,72	5,13	1,79
- KG, männlich	20	1,35	0,59	1,60	0,82	1,65	0,75	4,60	1,50
- KG, weiblich	20	1,80	0,83	2,05	0,89	1,80	0,70	6,65	1,93

**DAS Skala: Verachtung**

Gruppe	N	spöttisch		gerinschätzend		verachtungsvoll		Verachtung	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
insgesamt	140	1,14	0,39	1,20	0,53	1,09	0,34	3,42	0,94
Schizophrene	20	1,35	0,59	1,40	0,60	1,15	0,49	3,90	1,17
Interaktionspartner	20	1,25	0,55	1,25	0,44	1,15	0,37	3,65	0,99
- ambulante Sci.	10	1,40	0,70	1,20	0,42	1,00	0,00	3,60	0,70
- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,20	0,42	1,10	0,32	3,40	0,70
- hospitalisierte Sci.	10	1,30	0,48	1,60	0,70	1,30	0,67	4,20	1,48
- Interaktionspartner	10	1,40	0,70	1,30	0,48	1,20	0,42	3,90	1,20
Psychosomatiker	30	1,10	0,31	1,33	0,76	1,07	0,26	3,45	0,91
Interaktionspartner	30	1,03	0,18	1,07	0,37	1,07	0,25	3,17	0,75
- Wirbelsäule	10	1,10	0,32	1,70	1,06	1,10	0,32	3,90	1,10
- Interaktionspartner	10	1,10	0,32	1,20	0,63	1,20	0,42	3,50	1,27
- Colitis	20	1,10	0,31	1,15	0,49	1,05	0,23	3,21	0,71
- Interaktionspartner	20	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
--Colitis, männlich	10	1,10	0,32	1,30	0,67	1,11	0,33	3,33	1,00
-- Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
-- Colitis, weiblich	10	1,10	0,32	1,00	0,00	1,00	0,00	3,10	0,32
--Interaktionspartner	10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
Kontrollgruppe	40	1,10	0,30	1,08	0,35	1,08	0,35	3,25	0,87
- KG, männlich	20	1,10	0,31	1,10	0,45	1,15	0,49	3,35	1,14
- KG, weiblich	20	1,10	0,31	1,05	0,22	1,00	0,00	3,15	0,49